Agrowin B.V.
Binnenboomweg 16
7109 BK Winterswijk
T. 0543 – 56 52 34
E. Winterswijk@Agrowin.nl

Depot Goor
Haven 8
7471 LV Goor
T. 0547 – 27 52 52
E. Goor@Agrowin.nl

Nieuwsbrief ***Akkerbouw*** ***8 juni 2023***

Phytophthora beregende aardappelen
Onder huidige, droge, omstandigheden is er geen gevaar voor Phytophthora. Ook komende periode lijkt dit nog niet aan de orde. We zien echter de eerste percelen aardappelen die beregend worden. Op deze percelen is het wel verstandig om voorafgaand aan de beregeningsbeurt een bespuiting tegen Phytophthora uit te voeren. Bij overige percelen is het zaak de voorspellingen goed te volgen. Bij al verder ontwikkelde aardappelen zou het goed kunnen dat de eerste Phytophthora bespuiting straks direct al met Zorvec kan. Dit middel kan namelijk het beste ingezet worden vanaf de snelle loofgroeifase. Op percelen waar risico is op Sclerotinia (rattenkeutelziekte) is het raadzaam wel te beginnen met 1 tot 2 keer Kunshi. Bij toepassing vóór het sluiten van het gewas geeft Kunshi namelijk een nevenwerking op Sclerotinia. Over het algemeen zijn rassen met dunne/slappe stengels (o.a. Seresta en BMC) gevoeliger voor beschadiging. Beschadiging van de stengels vormen een ingangspoort voor Sclerotinia. Stem dit af met uw adviseur.

Minder ontwikkelde gewassen
We zien onderweg in diverse gewassen en wisselende stand en soms een trage ontwikkeling. In suikerbieten zorgen bijv. bietenaaskevers en zwarte bonenluizen voor een slechte groei. Soms kan het zinvol zijn dit soort gewassen een boost te geven. Uiteraard dient wel eerst de oorzaak van de slechte groei verholpen te worden door bijvoorbeeld de schadelijke insecten aan te pakken. Vervolgens kan bijvoorbeeld Cropfuel + Molybdeen het bietengewas een boost geven. Een ander mooi product met diverse sporenelementen voor de bietenteelt is Optima Sugar+. Het is zeker niet altijd nodig om direct bladmeststoffen in te zetten, maar in bepaalde situaties kan het de plant nét even helpen weer goed aan de groei te komen. Beoordeel dus altijd zelf goed de situatie en bespreek de mogelijkheid van het inzetten van bladmeststoffen met uw adviseur.

Ontwikkeling zomergerst
De wat vroeger gezaaide zomergerst komt in het vlagblad. Dit betekend dat het gewas afgespoten kan worden. We zien de eerste graanhaantjes ook in de percelen. Graanhaantjes kunnen zich in zeer korte tijd snel ontwikkelen en zorgen voor vraatschade aan het vlagblad. Bij een flinke bezetting van graanhaantjes kan een pyrethroïde toegevoegd worden aan de fungicide. Spuit, zeker op percelen met een hogere Ph, ook mangaan mee. Onder huidige droge omstandigheden treedt mangaangebrek nog sneller op.

Bijbemesten zaaiuien
We zien onderweg zaaiuien in veel verschillende stadia. Wanneer het gewas 2 echte pijpjes heeft (gemiddeld bij 10 cm gewashoogte) is het een goed moment de uien bij te bemesten. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met Kas. Daarnaast kan het op sommige percelen zinvol zijn aan de onkruidbespuiting een bladmeststof toe te voegen. Uien zijn o.a. dankbaar voor mangaan. Mangaan zorgt er voor dat het gewas mooi rechtop blijft staan.

Coloradokevers
We zien steeds meer coloradokevers. Ondertussen zijn de larven ook al steeds meer te vinden. Op percelen met aardappelopslag zijn de coloradokevers uiteraard welkom. Alleen kennen ze helaas het verschil nog niet tussen een aardappelplant die moet blijven staan en een aardappelplant die niet gewenst is. Het is dus belangrijk de aardappelgewassen goed te controleren de komende periode. Het kan soms heel hard gaan. Spuiten heeft pas zin als de larven aanwezig zijn, die richten de meeste schade aan. Er kan dan een bespuiting uitgevoerd worden met 60 ml Coragen in 400 ltr water.

Weersomstandigheden rondom spuiten
Tijdens huidige, droge/schrale, weersomstandigheden is het kiezen van het juiste spuitmoment en het gebruik van voldoende water extra belangrijk. Wanneer bijvoorbeeld contactherbiciden worden gespoten onder flink afgeharde omstandigheden kan dit het effect van een bespuiting volledig teniet doen. We zitten momenteel nog volop in de bespuitingen met contactherbiciden. Met uitzondering van uien (juist een grove druppel nodig) is het zaak

Op al onze aanbiedingen, offertes, leveringen en op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, welke wij u op aanvraag graag toezenden. Wij wijzen uitdrukkelijk andere algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de hand.

Agrowin B.V.
Binnenboomweg 16
7109 BK Winterswijk
T. 0543 – 56 52 34
E. Winterswijk@Agrowin.nl

Depot Goor
Haven 8
7471 LV Goor
T. 0547 – 27 52 52
E. Goor@Agrowin.nl

contactherbiciden op klein onkruid met een zo fijn mogelijke druppel te spuiten. Hoe kleiner het onkruid, hoe minder ook de al ontwikkelde waslaag van deze onkruiden. Onder huidige schrale omstandigheden is het zaak voldoende water te gebruiken (minimaal 325 ltr). Daarnaast is het onkruid het minst afgehard wanneer de luchtvochtigheid hoog is. Bij hogere luchtvochtigheid worden middelen beter opgenomen. Contactherbiciden (o.a. Betanal, Titus, Sencor, etc.), maar ook systemische fungiciden in bijvoorbeeld granen (Priaxor Duo, Elatus Era, etc.) moeten opgenomen kunnen worden door het onkruid of de plant. Bij een luchtvochtigheid <70% is de werking van middelen die opgenomen moeten worden een stuk minder goed. Dit betekend dat bij huidige weersomstandigheden het beste spuitmoment globaal tussen 21.00u en 10.00u ligt (RV >70%). Dit blijkt ook uit de app van SmartFarm. Deze app is gekoppeld aan diverse weerpalen die we verspreid over de regio hebben staan. Hiernaast een uitdraai voor de werking van Titus op een aardappelperceel in Laren. Overdag is er weinig effect van de bespuiting. Dus contactherbiciden en systemische fungiciden ’s morgens op tijd spuiten of ’s avonds later in de avond. Houd hier zeker rekening mee bij percelen waar het onkruid nog even goed aangepakt moet worden. Gebruik van voldoende olie is nu ook zeker nodig om voldoende opname te krijgen.



STORL inzameling

STORL is gestart met inzamelen en recycling van lege cans van gewasbeschermingsproducten. Deze gratis duurzame inzameling is een samenwerking van Croplife NL, Agrodis, Cumela en LTO Nederland. Doe mee en start met verzamelen. Cans schoon, droog, zonder dop in STORL zakken aanbieden. Aanmelden en meer informatie is hier te vinden.

Op al onze aanbiedingen, offertes, leveringen en op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, welke wij u op aanvraag graag toezenden. Wij wijzen uitdrukkelijk andere algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de hand.